


Stroomdiagram meningitis – draingerelateerd (EVD/ELD/VPD)



Legenda stroomdiagram meningitis – draingerelateerd

1. Voor empirische therapie zie [meningitis - draingerelateerd \(EVD/ELD/VPD\)](#)

2. *Cutibacterium acnes* = voormalige *Propionibacterium acnes*

CNS: coagulase negatieve staphylokokken o.a. *S. epidermidis*, *S. hominis*, *S. haemolyticus*, *S. capitis*, *S. caprae*, *S. cohnii*

3. GNS: Gram-negatieve staven oa. *Escherischia coli*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia spp.*

4. 16s PCR wordt enkel uitgevoerd bij een Gram-preparaat waar micro-organismen in zijn gezien

5. Indien pleicytose aanwezig in combinatie met tekenen van infectie (CRP/koorts) dan wel braken, hoofdpijn of meningeale prikkeling, stoppen i.o.m. arts-microbioloog/ infectioloog

6. Het drainvrije interval wordt in de praktijk meestal gerealiseerd door de externe drain reeds op zaal te verwijderen alvorens een nieuwe drain te plaatsen. Er zijn geen aanbevelingen omtrent de optimale duur van het drainvrije interval.